Covid-19: Persistência do SAR-CoV-2 em superfícies inanimadas e risco de contágio por embalagens para alimentos

Gustavo Henrique Moraes
Pesquisador do Cetea

A pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2 da família dos coronavírus, levantou preocupações acerca do surgimento de novas doenças e dos possíveis impactos causados por crises dessa natureza. Fatores como crescimento populacional acelerado, que muitas vezes pressiona a expansão de cidades para regiões rurais, aumentando as chances de contato da população com animais silvestres; e fatores culturais como hábitos alimentares, tais como consumo de produtos de origem animal, nos colocam na iminência do surgimento de novas doenças.

Um modelo de comercialização de alimentos que levantou a atenção de autoridades sanitárias ao redor do mundo com a pandemia foi o dos mercados úmidos, dado que os primeiros casos de infecção pelo vírus foram associados ao mercado de carnes e frutos do mar da cidade de Wuhan, na China. O termo “mercado úmido” refere-se ao ambiente úmido resultado do derretimento do gelo usado para manutenção dos alimentos frescos e à lavagem do chão para remoção de resíduos como sangue das carnes comercializadas e dejetos da possível comercialização de animais vivos. Nesses mercados, comuns na Ásia, África e América Latina, as tendas onde os produtos são comercializados são abertas e sem controles rigorosos de contaminação cruzada. Alguns mercados úmidos contam ainda com a venda de produtos derivados de animais silvestres ou mesmo desses animais vivos, ainda que de forma ilegal em diversas regiões. O contato direto entre humanos e animais aumenta o risco de transmissão de novos microrganismos patogênicos com potenciais de causarem grandes episódios de contaminação, como a Covid-19. Isso, pois embora o contato direto com qualquer animal possa representar um risco ao desenvolvimento de doenças zoonóticas (de origem animal), quando esse contato ocorre com animais silvestres, tem-se o fator complicador de o organismo humano dificilmente já ter tido a oportunidade de desenvolver mecanismos de defesa^[1,2]. Vale ressaltar que nem todos os mercados úmidos comercializam animais exóticos ou produtos derivados de animais exóticos e essa é uma prática cada vez mais proibida, como consequência da pandemia.

O debate sobre a permissão para operação dos mercados úmidos é bastante controverso, pois ao mesmo tempo em que representam um risco maior do surgimento de doenças, eles são uma prática cultural, sustentam milhões de pequenos produtores e comerciantes locais e contribuem para que as pessoas se sintam mais conectadas com seus alimentos e suas origens. Além disso, os mercados úmidos garantem o acesso a produtos frescos e mais baratos a famílias com menores poderes aquisitivos, portanto o banimento dessa prática sem uma assistência governamental impactaria na segurança alimentar, bem como levaria à migração da prática para comércios ilegais^[3]. Algumas medidas que permitem maior segurança desse tipo de comércio são: fornecimento de água com qualidade, ventilação adequada,

melhoria das estruturas das tendas, implementação de sistemas de gerenciamento da segurança dos alimentos, boas práticas de higiene, treinamento dos funcionários e sistemas de rastreio^[4].

As formas tradicionais de comercialização de alimentos também levantam preocupações ao consumidor, que passou a se sentir inseguro com a possibilidade de contaminação do novo coronavírus pelo manuseio direto de alimentos e de suas embalagens. Autoridades sanitárias, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, entretanto, salientam que até o momento não existem comprovações científicas de que essa seja uma via importante de contaminação pelo SARS-CoV-2. Segundo essas autoridades, a principal via de contaminação ocorre de pessoa para pessoa através da eliminação de gotículas contendo o vírus quando alguém fala, tosse ou espirra^[5,6]. Além disso, uma vez que o vírus necessariamente precisa de um hospedeiro vivo para sobreviver, o novo coronavírus não se multiplica em alimentos^[5].

Ainda que o contato com superfícies contaminadas não seja a principal rota de transmissão do vírus, essa é uma via possível. A dificuldade no isolamento da transmissão via superfícies dos demais mecanismos de contágio é um obstáculo importante para que se determine se este contribui significativamente ou não. Na literatura científica estão disponíveis estudos cujos autores avaliaram a persistência do SARS-CoV-2 em diferentes superfícies inanimadas. Os resultados encontrados são apresentados na Figura 1 e expressam os períodos a partir dos quais o vírus deixou de ser detectado para diversos materiais.

FIGURA 1. Períodos nos quais o SARS-CoV-2 deixou de ser detectado após deposição em diferentes superfícies inanimadas em diferentes estudos.

A Figura 1 permite verificar que em superfícies de plástico o vírus deixou de ser detectado em sua forma viável após exposição, a partir do 4º dia, em um segundo estudo este ainda foi detectado no 7º dia, período de duração do monitoramento. Em metal, os trabalhos mostram desativação mais rápida do vírus em cobre, com persistências inferiores a 8 horas, quando comparada ao aço inoxidável, com persistências inferiores a 3 dias em um estudo e de 7 dias e superior a esse período em outros dois estudos (sendo que no segundo o acompanhamento da atividade viral foi realizado apenas até esse período). Para o papel, as persistências do SARS-CoV-2 apresentaram valores menores, com viabilidades que variaram de até 3 horas em um dos estudos a até 7 dias em outro estudo. Em geral, em superfícies porosas, como papel, papelão ondulado (persistência de 2 dias), madeira (persistência de 2 dias) e cédula de dinheiro (persistência de 4 dias), o vírus se manteve ativo por períodos menores, quando comparadas a superfícies não porosas (plástico; aço inoxidável; vidro – 4 dias; e cerâmica – 7 dias)^[7-9]. Provavelmente, isso ocorre como consequência do espalhamento das gotículas nesses materiais, favorecido por efeitos de capilaridade,

aumentando-se assim a área superficial da fase líquida (meio de sobrevivência do vírus) em contato com a atmosfera, com sua conseqüente evaporação^[10]. Em máscara cirúrgica, em geral composta por polipropileno (plástico), prevalece o comportamento observado para plásticos, com persistência viral de 7 dias.

No Figura 1 verifica-se também que para um mesmo material em diferentes estudos, as persistências máximas observadas apresentam grandes variações. Isso pode estar associado a fatores como variabilidade de um mesmo material (diferentes tipos de plásticos e aditivos, diferentes tipos de vidros etc.), linhagens e concentrações iniciais dos vírus, perda de carga viral nas recuperações do microrganismo das superfícies, solução transportadora do vírus e fatores ambientais como temperatura e umidade relativa (UR). A influência desses dois últimos fatores foi investigada no trabalho de Biryukov et al.^[11], onde os autores avaliaram a persistência do SARS-CoV-2 em aço inoxidável e em luva de borracha nitrílica sob condições de temperatura e umidade relativa que variaram de 24 a 35 °C, e de 20 a 80% UR, respectivamente. Os autores verificaram queda nas persistências do vírus com o aumento dessas duas variáveis. No trabalho de Chin et al.^[9], verificou-se o decaimento do vírus pelo período de 14 dias sob as condições de temperatura de 4, 22, 37, 56 e 70 °C. O mesmo comportamento de redução crescente da viabilidade viral com o aumento da temperatura foi observado. Em 4 °C, após 14 dias a redução da carga viral foi discreta, de 6×10^8 TCID₅₀/mL para 1×10^8 TCID₅₀/mL, enquanto que para as demais temperaturas o vírus deixou de ser detectado, respectivamente, após 14 dias, 2 dias, 30 minutos e 5 minutos (o limite de detecção do método foi de 1×10^2 TCID₅₀/mL).

Essas observações sugerem a possibilidade de manutenção do vírus ativo em temperaturas baixas por longos períodos, o que levanta o questionamento quanto ao seu transporte em embalagens de alimentos resfriados e congelados. A detecção de material genético do SARS-CoV-2 em embalagens de frango e de camarão congelados exportados, respectivamente do Brasil e do Equador, pela China em agosto de 2020, causou como resposta uma paralisação temporária na importação de alimentos pelo país. Ainda que a detecção do material genético do vírus nesses produtos seja motivo de alerta, especialistas dizem que o mesmo não necessariamente está em sua forma viável e que uma investigação mais detalhada deve ser realizada para investigação da capacidade de contaminação nessas condições.

A desinfecção de superfícies, incluindo das embalagens de alimentos, tem sido uma alternativa para que os consumidores se sintam mais seguros ao chegarem em suas residências dos supermercados. Chin et al.^[9] avaliou a desativação do SARS-CoV-2 após contato com soluções de alvejante doméstico (proporções 1:49 e 1:99), solução de sabonete de mãos (50%), etanol (70%), iodopovidona (7,5%), cloroxilenol (0,05%), clorexidina (0,05%) e cloreto de benzalcônio (0,1%). Com exceção da solução de sabonete de mãos, que apresentou carga viral indetectável apenas após 15 minutos de contato para uma das três réplicas, todas as outras soluções apresentaram redução à níveis indetectáveis do vírus após 5 minutos de contato. Embora o estudo tenha verificado que a desativação do vírus foi eficiente nas condições estudadas, faz-se necessária uma investigação com condições mais próximas à realidade de uma pessoa desinfetando uma superfície por períodos menores.

Os estudos de persistência do SARS-CoV-2 em materiais como plástico, vidro, metal e papel, usualmente empregados em embalagens de alimentos, revelam permanência do vírus por períodos que variaram de algumas horas a mais de 7 dias. Embora a transmissão por essa via não seja vista como o mecanismo principal de contágio, deve-se manter o alerta e os cuidados com a manipulação dos produtos no momento da compra e quando o consumidor chega em sua residência. A desinfecção de embalagens com produtos de limpeza é uma maneira do consumidor se proteger, mas a efetividade dessa medida deve ser avaliada mais profundamente.

Referências bibliográficas

- [1] SAMUEL, S. The coronavirus likely came from China's wet markets. They're reopening anyway. **Vox.com**, Apr. 15, 2020. Disponível em: <https://www.vox.com/future-perfect/2020/4/15/21219222/coronavirus-china-ban-wet-markets-reopening>
- [2] GOYAL, P. Wet markets and food laws in India: what is needed to ensure safety and hygiene. **EPW Engage**, v. 55, n. 31, Aug. 2020. Disponível em: <https://www.epw.in/engage/article/wet-markets-and-food-laws-india-what-needed-ensure-safety-hygiene>
- [3] CHANDRAN, R. Traditional markets blamed for virus outbreak are lifetime for Asian's poor. **Reuters**, Feb. 7, 2022. Disponível em: <https://www.reuters.com/article/southeast-asia-health-markets/traditional-markets-blamed-for-virus-outbreak-are-lifetime-for-asias-poor-idUSL8N2A5201>
- [4] MAHMOUD, B. Modernized wet markets: na approach to prevent future global public health crisis. **Food Safety Magazine**, June 2, 2020. Disponível em: <https://www.foodsafetymagazine.com/enewsletter/modernized-wet-markets-an-approach-to-prevent-future-global-public-health-crises/>
- [5] WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Coronavirus disease (COVID-19): food safety for consumers**. Geneva: WHO, Aug. 14, 2020. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-food-safety-for-consumers>
- [6] CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. **Food and coronavirus disease 2019 (COVID-19)**. Atlanta: CDC, Dec. 31, 2020. Disponível em: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/food-and-COVID-19.html>
- [7] VAN DOREMALEN, N. *et al.* Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. **The New England Journal of Medicine**, v. 382, n. 16, p. 1564-1567, mar. 2020.
- [8] LIU, Y. *et al.* Stability of SARS-CoV-2 on environmental surfaces and in human excreta. **Journal of Hospital Infection**, v. 107, p. 105-107, jan. 2021.
- [9] CHIN, A. W. H. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions. **The Lancet Microbe**, v. 1, n. 1, abr. 2020.
- [10] CHATTERJEE, S. *et al.* Why coronavirus survives longer on impermeable than porous surfaces. **Physics of fluids**, v. 32, n. 2, fev. 2021.
- [11] BYRYUKOV, J. *et al.* Increasing Temperature and Relative Humidity Accelerates Inactivation of SARS-CoV-2 on Surfaces. **mSphere**, v. 5, n. 4, p. 1-9, jul. 2020.